

レジメン名	適応がん種	催吐リスク	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース
CAP+BV	大腸癌	最小	ゼローダ アバスチン	2000mg/m ² 7.5 mg/kg	30分(初回90分)	day 1夕～15朝 day 1	21日
IRIS(S-1/CPT-11)療法	大腸癌	中等度	イリノテカン S-1	125mg/m ² *1	90分	day 1, 15 day 1夕～15朝	28日
IRIS(S-1/CPT-11)+BV	大腸癌	中等度	S-1 イリノテカン アバスチン	80mg/m ² 100mg/m ² 5mg/kg	30分(初回90分) 90分	day 1夕～15朝 day 1, 15 day 1, 15	28日
IRIS(S-1/CPT-11)+P-mab	大腸癌	中等度	S-1 イリノテカン ベクティビックス	*1 150mg/m ² 6mg/kg	90分 60分	day 1～14 day 1, 15 day 1, 15	28日
FOLFIRI	大腸癌	中等度	イリノテカン レボホリナート 5-FU(bolus) 5-FU(46hr)	150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	90分 2時間 全開 46時間	day 1	14日
FOLFIRI+BV	大腸癌	中等度	アバスチン イリノテカン レボホリナート 5-FU(bolus) 5-FU(46hr)	5mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	1時間 90分 2時間 全開 46時間	day 1	14日
FOLFIRI+RAM	大腸癌	中等度	サイラムザ イリノテカン レボホリナート 5-FU(bolus) 5-FU(46hr)	8mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	1時間 2時間 2時間 全開 46時間	day 1	14日
XELOX	大腸癌	中等度	ゼローダ オキサリプラチン	2000mg/m ² 130mg/m ²	2時間	day 1夕～15朝 day 1	21日
XELOX+BV	大腸癌	中等度	ゼローダ オキサリプラチン アバスチン	2000mg/m ² 130mg/m ² 7.5mg/kg	2時間 1時間(初回90分)	day 1夕～15朝 day 1 day 1	21日
FOLFIRI+P-mab	大腸癌	中等度	ベクティビックス イリノテカン レボホリナート 5-FU(bolus) 5-FU(46hr)	6mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	1時間 90分 2時間 全開 46時間	day 1	14日

レジメン名	適応がん種	催吐リスク	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース
mFOLFOX6	大腸癌	中等度	オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(bolus) 5-FU(46hr)	85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	2時間 2時間 全開 46時間	day 1	14日
mFOLFOX6+BV	大腸癌	中等度	アバスチン オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(bolus) 5-FU(46hr)	5mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	1時間 2時間 2時間 全開 46時間	day 1	14日
mFOLFOX6+P-mab	大腸癌	中等度	ベクティビックス オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(bolus) 5-FU(46hr)	6mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	1時間 2時間 2時間 全開 46時間	day 1	14日
FOLFOXIRI	大腸癌	高度	イリノテカン レボホリナート オキサリプラチン 5-FU	165mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 3200mg/m ²	1時間 2時間 2時間 46時間	day1	14日
FOLFOXIRI+BV	大腸癌	高度	アバスチン イリノテカン レボホリナート オキサリプラチン 5-FU	5mg/kg 165mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 3200mg/m ²	1時間 1時間 2時間 2時間 46時間	day1	14日

*1

体表面積	S-1投与量	
1.25m ² 未満	80mq/day	分2
1.25m ² 以上～1.5m ² 未満	100mg/day	分2
1.5m ² 以上	120mq/day	分2