

レジメン名	適応がん種	催吐リスク	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1コース
NF療法	食道癌	中等度	5-FU アケプラ	800mg/m ² 90mg/m ²	24時間 90分	day 1~5 day 1	28日
FP(CDDP/5-FU)術後	食道癌	高度	シスプラチン 5-FU	80mg/m ² 800mg/m ²	2時間 24時間	day 1 day 1~5	28日
低用量FP療法+RT	食道癌	高度	シスプラチン 5-FU	4mg/m ² 200mg/m ² RT	2時間 24時間	day 1~5	
低用量FP療法+RT (2日間)	食道癌	高度	シスプラチン 5-FU	4mg/m ² 200mg/m ² RT	2時間 24時間	day 1~5	
CRT療法 FP70 / 700(放射線併用)	食道癌	高度(day 1) 軽度(day2~5)	シスプラチン 5-FU	70mg/m ² 700mg/m ² RT	2時間 24時間	day 1 day 1~4	28日
CRT療法 FP75/ 1000(放射線併用)	食道癌	高度(day 1) 軽度(day2~5)	シスプラチン 5-FU	75mg/m ² 1000mg/m ² RT	2時間 24時間	day 1 day 1~4	28日